

Si Vacuna a Su Hijo, Descubra Como Reconocer los signos y Síntomas de las Reacciones a las Vacunas*



REACCIONES DE LAS VACUNAS

Fiebre Alta (más de 103° F)

Piel (urticaria, erupciones cutáneas, inflamación)

Gritos Agudos

Colapso/Shock

Excesiva Somnolencia

Convulsiones

Inflamación Cerebral

Cambios en el comportamiento

Regresión mental/física

Otras reacciones a las vacunas reportadas incluyen: pérdida de control muscular, parálisis, autismo regresivo, asma, artritis, trastornos sanguíneos, diabetes, Síndrome de Guillain-Barré, muerte súbita.

** Llame a un médico inmediatamente o vaya a una sala de emergencias si se presentan síntomas graves de complicaciones por reacciones a la vacuna, o cambios drásticos en el comportamiento físico, mental o emocional, posteriormente a la vacunación.*

DESCRIPCIÓN DE LA MADRE

“Su temperatura era de 105 grados. Tuve que ponerle compresas frescas para bajarle la fiebre.”

“Había una protuberancia grande, caliente e inflamada en el sitio donde se suministroo la dosis, que permaneció por semanas.”

“Fue un grito de dolor, un grito estridente y duró por horas y nada ayudaba”.

“Ella se puso blanca con un matiz azulado alrededor de la boca y se torno completamente inerte”.

“Él se desmayó y no pudimos despertarlo para alimentarlo o hacer algo, por más de 12 horas”.

“Sus ojos tenían un tic, su barbilla temblaba, su cuerpo se puso rígido y luego se sacudía”.

“El estaba en su cuna con sus ojos muy abiertos luego arqueaba su espalda, gritaba y se quedaba inconsciente. Ahora tiene convulsiones”.

“Ella no duerme ni come, se tira al suelo y grita sin razón. Ella era dulce y feliz, y ahora está fuera de control; cambió y se convirtió en una niña totalmente diferente”.

“Mi hijo de 18 meses de edad dejo de hablar y caminar, después de suministrarle esas dosis. Él desarrolló severas alergias, diarrea constante, infecciones del oído y estaba enfermo todo el tiempo”.

LEY NACIONAL DE LESIONES POR VACUNAS INFANTILES PROMULGADA EN 1986

Para junio de 2016, se habían otorgado más de US\$ 3.3 billones por las lesiones y muertes provocadas por las vacunas, en más de 4 500 niños y adultos.

REPORTE LAS REACCIONES A LAS VACUNAS

Los problemas de salud importantes posteriores a la vacunación, deben ser documentadas en los registros médicos y reportados inmediatamente al Sistema para Reportar Reacciones Adversas a las Vacunas (VAERS, por sus siglas en inglés). También puede hacer informes sobre las reacciones por la vacunación al Registro de Reacciones por Vacunación del NVIC, el cual ha operado desde 1982 y sirve como órgano de control de los informes presentados al VAERS.

INFÓRMESE MÁS

Entre a la página de NVIC.org e infórmese más acerca de las señales y síntomas de las enfermedades infecciosas y reacciones por vacunas; cómo reportar las reacciones por las vacunas; cómo cumplir con los plazos para solicitar la indemnización federal por el daño ocasionado por las vacunas y cómo proteger su derecho legal de consentimiento informado para vacunación, en los Estados Unidos.

Vacunación

Su salud. Su familia. Su elección.



¿Es Seguro el Programa de Vacunación Infantil?

Una epidemia de enfermedades crónicas y discapacidad está muy generalizada en la niñez de los Estados Unidos, quienes son la población infantil más vacunada en el mundo y que también son los más crónicamente enfermos y discapacitados.

Actualmente, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) declaran que 1 de cada 6 niños en los Estados Unidos sufre de trastornos de conducta y aprendizaje, mientras que millones de ellos sufren de asma, diabetes y otras enfermedades alérgicas y autoinmunitarias crónicas. En las últimas cinco décadas, ha aumentado dramáticamente la epidemia de las enfermedades crónicas y discapacidades en los niños.

AUMENTAN LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS EN LOS NIÑOS DE LOS ESTADOS UNIDOS

1976: 1 de cada 30 niños tenía trastorno de aprendizaje.	→	2013: 1 de cada 6 niños tiene trastorno de aprendizaje.
1980: 1 de cada 27 niños tenía asma.	→	2013: 1 de cada 9 niños tiene asma.
1992: 1 de cada 500 niños desarrolló autismo.	→	2013: 1 de cada 50 niños desarrolla autismo.
2001: 1 de cada 555 niños tenía diabetes.	→	2013: 1 de cada 400 niños tiene diabetes.

HASTA TRES VECES MÁS VACUNAS PARA LOS NIÑOS

1953: Los CDC recomiendan 16 dosis de 4 vacunas (viruela, DTP) entre dos meses y los seis años de edad.
1983: Los CDC recomiendan 23 dosis de 7 vacunas (DTP, SPR, Polio) entre dos meses y los seis años de edad.
2013: Los CDC recomendaron 50 dosis de 14 vacunas entre el día de nacimiento y 6 años de edad y 69 dosis de 16 vacunas entre el día de nacimiento y los 18 años de edad.

MÚLTIPLES VACUNAS ADMINISTRADAS SIMULTANEAMENTE

En 1983, los CDC dieron instrucción a los médicos para suministrarles a los niños un máximo de 4 vacunas (DTP, Polio) simultáneamente. Para el 2013, los CDC dieron instrucción para que los niños puedan recibir 8 o más vacunas a la vez.

En el 2013, el Instituto de Medicina publicó un informe que declara *“los elementos clave de todo el calendario [que los CDC recomendaron para la vacunación infantil]--el número, frecuencia, periodo, orden y edad de administración de las vacunas--no fueron sistemáticamente examinados en los estudios de investigación”.*

VACUNACIÓN DURANTE EL EMBARAZO

Una nueva política de los CDC da instrucción a los médicos para suministrar a las mujeres embarazadas una dosis de la vacuna contra la influenza en cualquier trimestre del embarazo, y una dosis de Pertussis--que contiene la vacuna TDAP--después de las 20 semanas, durante cada embarazo. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) ha determinado que no se han realizado estudios extensos y bien controlados a largo plazo, para confirmar que las vacunas contra la influenza y la TDAP son seguras durante el embarazo.



¿DEBEN APLICARSE 50 DOSIS DE 14 VACUNAS ANTES DE LOS 6 AÑOS DE EDAD y 69 DOSIS DE 16 VACUNAS ANTES DE LOS 18 AÑOS DE EDAD?

Antes de arriesgarse, entérese que son.

Con base en el Calendario de Vacunación Infantil del 2017 Recomendado Por los CDC

NACIMIENTO (12 hours)

Hepatitis B

2 MESES

Difteria
Tétanos
Pertussis (o tosferina)
Polio
Vacuna contra Haemophilus influenza tipo B (HIB, por sus siglas en inglés)
Rotavirus
Hepatitis B
Vacuna Antineumocócica Conjugada (PCV, por sus siglas en inglés)

4 MESES

Difteria
Tétanos
Pertussis (o tosferina)
Polio
HIB
Rotavirus
PCV

6 MESES

Difteria
Tétanos
Pertussis (o tosferina)
Polio
HIB
Rotavirus
Hepatitis B
PCV
Influenza

7 MESES

Influenza

12 A 18 MESES

Difteria
Tétanos
Pertussis (o tosferina)
Sarampión
Paperas
Rubéola
HIB
PCV
Varicela
Hepatitis A (2)

2 A 6 AÑOS

Difteria
Tétanos
Pertussis (o tosferina)
Polio
Sarampión
Paperas
Rubéola
Varicela
Influenza (5)

7 A 18 AÑOS

Difteria
Tétanos
Pertussis (o tosferina)
Influenza (12)
Vacuna contra el Virus de Papiloma Humano (2)
Meningococo (2)



INGREDIENTES DE LAS VACUNAS: Las vacunas contienen diferentes ingredientes, incluyendo bacterias y virus vivos o inactivos, alterados en el laboratorio, sustancias químicas, metales, proteínas, antibióticos, y ADN y ARN de origen animal, humano y de insectos. Para obtener más información entre a la página de NVIC.org.